

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ว/ด/ป	เวลา	สถานที่
4/3/68	9.00-12.00	พื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4
5/3/68	9.00-12.00	พื้นที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7
6/3/68	9.00-12.00	พื้นที่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3
7/3/68	9.00-12.00	พื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5
10/3/68	9.00-12.00	พื้นที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9



เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รวมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป โดยนำสุนัข
และแมว ๒ เดือนขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า



เอกสารประชาสัมพันธ์

การป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า



เทศบาลตำบลเมืองเก่า

อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไร?

สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้ 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มแรก

มีอาการและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง

2. ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก วังโล่กัดคนหรือสัตว์

3. ระยะอัมพาต

ค้างคาง ลั่นห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



ติดเชื่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน

ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อยก็สามารถติดเชื่อได้



2. ถูกเสียดบาดแผล

รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน รวมทั้งริมฝีปากหรือนัยน์ตา



อาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

• อาการเริ่มแรก:

ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด



• อาการทางประสาท:

กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว



• อาการระยะสุดท้าย:

กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด



หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

1.

ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด

ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงกับแผล และล้างออกให้หมด

(ถ้าจำเป็นเวลานาน 15 นาที) การล้างแผล

จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง 80%



2.

ทายาบาดบิ่น

และรีบมาพบแพทย์

โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษา

และฉีดวัคซีนป้องกันโรค



3.

กักสุนัขเพื่อดูอาการ 10 วัน

ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตาย

แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4.

ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด

และควรเข้ารับวัคซีน

ให้ตรงตามที่แพทย์นัด



